


 Google Search

 Web Cet emplacement


SUPPORT FORUM

La Manche de phobie | La Manche de désordres de peau

Fondations de dépression	Types de dépression	L'information et aide	Traitements	Désordres	Médicament	Inquiétude	Neuropsychiatrie
Pédopsychiatrie	Désordres sexuels	Incapacité de étude	Articles	Appui Blog	Forum	Personnalité	Psychiatrie

· **Annonces Google** [Depression](#) [Anti Depression Drug](#) [Amisulpride](#) [Depression a Guide](#) [5 HTP Depression](#)

A || B || C || D || E || F || G || H || I || J || K || L || M || N || O || P || Q || R || S || T || U || V || W || X || Y || Z

[Vaincre la Dépression](#) Découvrez nos Suppléments pour Retrouver la Bonne Humeur ! www.Super-Smart.eu/Depression

[Imodiumlingual](#) Mal de ventre, Stress, Diarrhée,... Imodiumlingual vous renseigne ! www.diarrhee-passagere.fr

[Rhodiola Depression](#) Gratuit, le Livre de référence sur les bienfaits de la Rhodiola Depression www.rhodiola-naturamundi.com

Annonces Google

Amisulpride est efficace dans des symptômes aidants tels que les voix d'audition, perte d'énergie, perturbations de pensée, difficultés communiquant avec d'autres, souci, dépression, surmontant des sentiments de vouloir être seul aussi bien que d'autres symptômes de la schizophrénie.

Amisulpride est un benzamide substitué. Ceci appartient au groupe de médecines connues sous le nom d'*antipsychotiques*.

Amisulpride : un examen de son utilisation dans la gestion de la schizophrénie

Amisulpride, un dérivé substitué de benzamide, est un antipsychotique (atypique) de seconde génération. À de basses doses, il augmente la neurotransmission dopaminergique en bloquant préférentiellement des autorecepteurs présynaptiques de la dopamine D2/D3. À des doses plus élevées, à la dopamine postsynaptic D2 d'antagonises d'amisulpride et à des récepteurs D3, préférentiellement dans le système limbic plutôt que le striatum, réduisant de ce fait la transmission dopaminergique. Dans les patients présentant des exacerbations aiguës de la schizophrénie, le dosage recommandé de l'amisulpride est 400 à 800 mg/jour, bien que des dosages < ou le = 1200 mg/jour puissent être administrés. Dans des épreuves comparatives, l'amisulpride administré dans ce mg/jour de la gamme (400 à 1200) était aussi efficace que mg/jour de l'halopéridol 5 à 40, le flupenthixol 25 mg/jour et le risperidone 8 mg/jour dans les patients présentant des exacerbations aiguës de la schizophrénie avec des symptômes principalement positifs.

Effets secondaires d'Amisulpride

L'insomnie, inquiétude, agitation sont des effets secondaires communs (se produisant dans 5-10%). La somnolence, la constipation, la nausée, le vomissement et la bouche sèche peuvent se produire dans jusqu'à 2% de patients. D'autres effets secondaires incluent le gain de poids, le dystonia aigu, les effets secondaires extrapyramidal, le dyskinesia tardive, l'hypotension, la bradycardie et la prolongation de quart.

Attentions et contres-indication

Dans les personnes âgées l'amisulpride peut causer l'hypotension et la sédation. Il n'y a aucune donnée éditée systématique sur l'efficacité chez les enfants moins de 15.

L'affaiblissement rénal réduit de manière significative le dégagement et prolonge la demi vie d'élimination de l'amisulpride et du risperidone (Caccia, 2000). S'il y a d'insuffisance rénale il devrait y a une réduction de la dose d'amisulpride. La dose devrait être divisée en deux si le dégagement de créatinine est entre 30-60 ml/min et est réduit à un tiers des dégagements entre 10-30 ml/min.

La prescription devrait être évitée s'il y a d'hypersensibilité prouvée à la drogue, à une tumeur dépendante de prolactine, au phaeochromocytoma, à la grossesse ou à la lactation.

Comment stocker Amisulpride

- Garder toutes les médecines hors de l'extension des enfants.
- Entreposé dans un endroit frais et sec, loin de la chaleur et de lumière directes.
- Ne jamais garder les médecines démodées ou non désirées. Les jeter sans risque hors de l'extension des enfants ou les porter à votre pharmacien local qui se débarrassera de eux pour toi.

[La maladie de Parkinson](#)

Traitement utilisant des cellule souches adultes de votre corps!

www.XCell-Center.fr/Parkinson

[Consultation psy en ligne](#)

Faire le point sur votre carrière ? Contactez notre expert

www.psychologue.pro

Bout de dépression

Concentrer vos pensées sur les petites choses positives. Ne pas laisser votre course d'esprit en avant à temps « ce qui si » et ne demeurent pas sur après ce qu'est et sur « si seulement ».

[Nous envoyer vos pensées](#)

Annonces Google

W H A T 'S NORD-EST W T
O D A Y :

Qu'est vers le haut sur notre blog ? ? Le

commentaire de psychologie et les nouvelles et la recherche intéressantes de autour du Web, blogged régulièrement.

Équilibre émotif
Traitement pour la schizophrénie
À quelle rapidité les antidépresseur fonctionnent-ils ?
Soucis de grossesse de SSRI
Le but de la dépression normale
Pensée raisonnable de étude
Plus du blog.



C'est un guide seulement - vérifier avec votre docteur. Cette information est pour des buts éducatifs seulement. Non chaque effet secondaire connu, effet nuisible, ou interaction de drogue est dans cette base de données. Si vous avez des questions au sujet de



La

Communauté de soutien là est beaucoup d'aide et d'appui dehors là 24*7 disponible, derrière votre écran d'ordinateur. Vous le besoin juste d'atteindre dehors pour l'aide. Poteaux récents :

► Si vous êtes déjà enregistrés. [Avancé dedans !](#)
 ► Nouveau au dépression-guide ? . [Registre maintenant !](#)

[NOUVEAU](#)
[MEMBRE](#)
[Allemand](#)
[Nouveau conjoint](#)
[questions lamictal](#)
[Nouveau membre :](#)
[RainbowLove](#)
[ici](#)
[Un autre sentiment d'internaute novice perdu et seulement bien, cette sorte de suce. J'aime mon ami mais Im enfoncé](#)
[Désordre de personnalité limite](#)
[svp aide im dieing ici](#)
[Quiconque a lu le « sentiment bon » ?](#)
[Cipralex et poids](#)
[Citalopram et Resperdal](#)
[Gardant un journal intime aide ?](#)
[seul se sentir](#)
[Sentiment juste triste récemment](#)
[la panique attaque presque chaque nuit](#)

secondaire connu, effet nuisible, ou interaction de drogue est dans cette base de données. Si vous avez des questions au sujet de vos médecines, parler à votre fournisseur de santé.

MÉDECINES d'ACHAT - votre dépression achetante en ligne de guide et médicaments mentaux de santé.

Pourquoi ne pas joindre nos forums et ne pas continuer à apprendre beaucoup de choses intéressantes tout en ayant l'amusement avec d'autres membres de forum ? Nous croire, vous l'aimera juste.

LA PLUPART DE SECTION POPULAIRE:

- Psychasthenia de Prémenstruel-dysphoric-
- Elavil de Manger-
- Deroxat de Descartes-
- démence de Pied-
- syndrome de Causer-de-mental-
- symptôme l'
- Amphétamine-dextroamphetamine d'
- schizophrénie de
- personnes de Bipolaire-désordre-
- enfants le Bipolaire-désordre-dans-
- huile de
- Trilafon de
- matelas De l'adolescence-
- syndrome de Sérotonine-syndrome-
- Antidépresseur-z d'
- Sharpe
- Dépression dans l'enfant
- Dépression dans les personnes âgées
- Femmes et dépression
- Dépression masculine
- Dépression de l'adolescence
- Expériences personnelles
- Thérapie existentielle
- Thérapie cognitive
- Thérapie post-moderne

Emplacement de signet | faire à guide de dépression ma page d'accueil

à la maison de || [Liste alphabétique de désordres](#) || [Appui Blog de dépression](#) || [Forum de soutien](#) || [Glossaire](#)

[Fondations de dépression](#) [Types de dépression](#) [Traitements](#) [Désordres](#) [Neuropsychiatrie](#) [Médicament](#) [Articles de dépression](#)

[contact au sujet de nous](#) || [de déni de](#) ||  [RSS FEED](#)



© 2005, www.depression-guide.com. Tous droits réservés.