

# **ANTIVERTIGINEUX ACÉTYLLEUCINE TEVA 500 mg (générique du Tanganil)**

## **ACÉTYLLEUCINE TEVA 500 mg Comprimé Boîte de 30**

Mis à jour le 12 février 2014

### **ACÉTYLLEUCINE TEVA : ses indications**

Traitement symptomatique de la crise vertigineuse.

### **ACÉTYLLEUCINE TEVA : pathologies pour lesquelles il peut-être prescrit**

- Crise vertigineuse

Classe thérapeutique	Neurologie-psychiatrie
Principes actifs	Acétylleucine
Excipients	Amidon de maïs, Calcium carbonate, Magnésium stéarate (E572)
Statut	Ce médicament est NON SOUMIS A PRESCRIPTION MEDICALE
Prix de vente TTC	4,25 €
Tx de remboursement SS	30 %
Laboratoire	Teva Sante

Présentation Précautions Grossesse et allaitement Effets indésirables

### **ACÉTYLLEUCINE TEVA : sa posologie**

#### **Chez l'adulte**

1,5 à 2 g par jour, soit 3 à 4 comprimés par jour, en deux prises matin et soir.

La durée du traitement est variable selon l'évolution clinique (entre 10 jours et 5 à 6 semaines); au début du traitement ou en cas d'insuccès, la posologie peut être augmentée sans inconvénient jusqu'à 3 g et même 4 g par jour.

#### **Mode d'administration :**

Voie orale.

### **ACÉTYLLEUCINE TEVA : son aspect et forme**

Comprimé blanc, biconvexe et de forme allongée.

Licence : © <http://www.doctissimo.fr/medicament-ACÉTYLLEUCINE-TEVA.htm>