

DEMENTOPHOBIE Peur de devenir fou

ou DEMENCOPHOBIE

*Phobie non officielle, non reconnue, non spécifique,
non classifiée en tant que trouble anxieux défini dans le DSM-5 et la CIM-11
DSM-5 Phobie spécifique de type maladie/blessure ou trouble anxieux
CIM-11 6B03 — Phobie spécifique, ou 6B23 — Anxiété liée à la santé*

De : Démence *nom fém.*

Dément *adj.*

Démentiel *abr.*

Démence est un terme technique, qui ne doit pas être confondu avec le sens commun de ce mot, qui équivaut *grosso modo* à « folie furieuse ». Autrefois, **démence** et folie étaient des synonymes, et les malades mentaux étaient qualifiés de **déments**.

La **démence** est la traduction clinique d'une neurodégénérescence. Elle est définie classiquement comme un « affaiblissement psychique profond, global et progressif ».

La **démence** altère progressivement, et en principe de manière irréversible, les fonctions intellectuelles fondamentales, notamment la mémoire, l'attention et le langage. En outre, elle retentit gravement sur les conduites sociales.

En fonction de l'âge du patient **dément**, on décrit des **démences** précoces (c'était autrefois l'autre nom de la schizophrénie), et des **démences** séniles, débutant, par convention, à partir de 65 ans. La **démence** sénile, ou sénilité, autrefois considérée comme inéluctablement liée au vieillissement, est le plus souvent assimilée de nos jours à la maladie d'Alzheimer, bien que celle-ci puisse commencer beaucoup plus tôt dans la vie (Alzheimer précoce).

La maladie d'Alzheimer est le plus fréquent des **états démentiels**, mais il en existe d'autres : **démence** de la maladie de Parkinson, **démence** vasculaire, **démence** à corps de Léwy. Certaines **démences** ont disparu, comme celle qui accompagnait la syphilis tertiaire (paralysie générale progressive). C'est de cette forme de **démence**, fréquente au XIX^{ème} siècle, que souffraient des artistes comme l'écrivain français Guy de Maupassant ou le compositeur allemand Robert Schumann.