

Delusional Disorder

Paranoia

Paranoïa

Paranoïa: Délires systematisés se développant dans l'ordre, la clarté, et la cohérence chez des personnes ayant un caractère particulier:
Hypertrophie du moi, méfiance, psychorigidité, fausseté de jugement

Formes du délire

- **Délire de persécution** - persécuté par le voisin, le patron , les collègues de travail, l'impression qu'il y a un complot contre lui

Formes du délire

- **Délire de revendication**
- Quérulent processeur: revendique ses droits sa propriété, Procès permanents qu'il perd, avec le sentiment d'être trahis, accumulation de sentiment de haine et de vengeance.
- Idéalistes passionnés avec conviction religieuse, sa conviction idéologique Idée de grandeur. Les intégristes religieux, racistes.
- Inventeurs- revendication de leur invention
- Sinistrose - survient après accident de travail ou sur la voie publique, multiple les contre expertise

Formes du délire

- **Délire d'interprétation** - Intuitif et imaginatif
- **Délire de jalousie**- delire d'infidélité et de revaluate
- **Desire érotomaniacque** – intuition délirante d'être aimée
 - stade d'espoir – collection de photos
 - Stade de dépit
 - Stade de rancune- drame passionnel

- **Schizophrénie**

- Délires polymorphes à thèmes multiples
- Hallucinations présentes
- Incohérence
- Comportement autistique
- Emotion plate

- **Paranoïa**

- Délire principalement de persécution et de revendication
- Hallucinations peu présentes
- Cohérence
- Comportement normal
- Emotion normale

Diagnostique Différentiel

- Dépression avec symptômes psychotiques car le délire est souvent de type persécution
- Trouble bipolaire car les idées de grandiosité sont présentes et parfois il y a aussi un délire de persécution et d'interprétation

Traitement

- Difficile a soigner car il y a absence de conscience de la maladie.
- Prevenir le passage a l'acte , evaluer la dangerosite du paranoiaque en periode passionnelle(persecuteur designe, acte raciste)
- Amenagement de la relation :
- Maintient d'une bonne distance lors des entretiens, ne pas critiquer, ni partager ses convictions Essayer d'établir un lien thérapeutique

Traitement

- Principalement Les Neuroleptiques Atypiques:
- Olanzapine, Risperidone, Quetiapine, Aripiprazole
- Antidépresseurs en cas de dépression associée
- Stabilisateur de l'humeur en cas de trouble bipolaire