

QUELLES SONT LES PRECAUTIONS A OBSERVER ?

L'ALCOOL :

L'association avec l'alcool est **contre indiquée**, surtout en début de traitement car elle peut entraîner une somnolence. Par la suite, une consommation modérée est possible. Parlez-en avec votre médecin.

LA DROGUE :

La consommation de ces produits peut favoriser une réapparition de problèmes liés à votre maladie : **il ne faut pas en prendre**.

LA REGULARITE DU TRAITEMENT :

La prise régulière du traitement conditionne son efficacité. Une interruption brutale du traitement vous expose à un mal-être (*rebond d'angoisse, d'insomnie, contractures*) dans les jours qui suivent, et à plus long terme, à une rechute.

La décision d'arrêter doit être prise en accord avec le médecin.

Si vous devez **prendre un autre médicament**, dites au médecin que vous vous soignez déjà avec du SOLIAN®. Demandez toujours l'avis d'un médecin ou d'un pharmacien si vous prenez de vous-même un autre médicament non prescrit.

QUE DOIS-JE SURVEILLER PENDANT MON TRAITEMENT ?

LE POIDS :

La surveillance du poids est nécessaire dès le début du traitement. Il est recommandé d'éviter les sucreries et de pratiquer des activités physiques. Une prise de poids supérieure à 5 kgs après trois mois de traitement nécessite une consultation diététique.

LES DENTS :

Faites-les surveiller régulièrement. Il est recommandé de se brosser les dents si possible après chaque repas, et au moins une fois par jour, avant le coucher.

LA PEAU :

En cas d'exposition au soleil, protégez les parties découvertes du corps par une crème écran haute protection.

COMMENT CONSERVER VOTRE MEDICAMENT ?

Laissez-le dans son étui, hors de la portée des enfants. Ne laissez pas la boîte en plein soleil. Vous pouvez également préparer un semainier qui vous permet de ne pas oublier de prendre votre traitement.

Novembre 2000

FICHE D'INFORMATION

SOLIAN® (Amisulpride)

SOLIAN® est un médicament ANTIPSYCHOTIQUE. Il fait partie des neuroleptiques dits atypiques. Il existe quatre présentations :

- SOLIAN® comprimé sécable à 400 mg blanc,
- SOLIAN® comprimé sécable à 100 mg blanc,
- SOLIAN® comprimé sécable à 200 mg,
- SOLIAN® gouttes buvables à 100 mg/ml.

QUEL BENEFICE POUVEZ-VOUS ATTENDRE DE VOTRE MEDICAMENT ?

SOLIAN® vous a été prescrit pour améliorer chez vous certains troubles psychiques.

Selon les personnes, ces troubles se traduisent par des signes tels que : *entendre, voir ou sentir des choses qui ne sont pas perçues par d'autres personnes (ce sont des hallucinations), être envahi par un excès d'idées, d'émotions, de croyances, de suspicions (ce sont des délires). Le comportement peut devenir trop exubérant, ou au contraire, chercher l'isolement ou ne pas avoir envie de communiquer.*

Les personnes qui souffrent de tels troubles peuvent aussi se sentir déprimées, angoissées, irritables ou tendues.

SOLIAN® peut améliorer et soulager ces manifestations.

Fiches réalisées selon les recommandations de
l'A.N.A.E.S. (Agence Nationale de
l'Accréditation et de l'Evaluation de la Santé)
par les Pharmaciens Hospitaliers du réseau P.I.C.
e.mail : reseau.pic@wanadoo.fr

COMMENT PRENDRE VOTRE MEDICAMENT ?

Suivez ce que vous a prescrit votre médecin. La posologie (quantité de médicament) peut être très différente suivant les besoins. Vérifiez bien le dosage des comprimés ou la quantité de gouttes que vous a prescrit votre médecin.

De façon générale, si la dose quotidienne est inférieure à 400 mg, l'administration se fera en une prise par jour, le matin ou le soir. Au-delà de 400 mg, l'administration se fera en deux ou trois prises par jour, avec un verre d'eau. Comme pour tout médicament, il est conseillé de **ne pas le prendre en position couchée**.

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI D'UNE PRISE ?

Si le retard est de **moins de deux heures** prendre immédiatement le médicament.

Au-delà de deux heures, sauter la prise et prendre la quantité prescrite la fois suivante : **ne doublez jamais les prises**.

QUELS AUTRES EFFETS PEUVENT APPARAÎTRE ?

La majorité des effets non désirés qui surviennent ne sont pas graves. Ils peuvent être différents d'une personne à l'autre et plus ou moins gênants. Ils régressent, en général, dans les premières semaines du traitement. Il faut les connaître pour pouvoir les identifier ou les éviter, et dans tous les cas, en parler à votre médecin qui recherchera une solution pour les atténuer, voire les faire disparaître.

EFFETS	QUE DOIS-JE FAIRE ?
Troubles hormonaux : <i>Perturbation des règles, Écoulement de lait, Tension mammaire, Impuissance, frigidité.</i>	Ce n'est habituellement pas grave. Parlez-en à votre médecin.
Prise de poids	Pesez-vous régulièrement pour contrôler votre poids. Ne mangez pas trop de sucreries ni de graisses. Faites du sport, marchez le plus souvent possible.
Tremblements, rigidité musculaire, hypersalivation (<i>peu fréquent</i>)	Si cela est gênant, parlez-en à votre médecin pour adapter le traitement ou corriger ces effets.
Somnolence, fatigue, difficulté de concentration (<i>occasionnellement</i>)	Parlez-en à votre médecin pour une réévaluation du traitement. Soyez prudent dans les situations qui nécessitent de l'attention.
Troubles gastro-intestinaux : nausées, vomissements, bouche sèche (<i>peu fréquent</i>)	En général, ces troubles disparaissent progressivement.