

Surdité (294)

Docteur Dinh-Qui NGUYEN
Novembre 2005

Pré-requis :

- Polycopié d'ORL, Pr Reyte, Pr Charachon
- Précis d'ORL. M. Portmann, Ed. Masson 1982
- Décision en ORL, F. Chabolle, E-N Garabédian, Ed. Vigot 1994

Résumé :

Toute surdité, toute hypoacousie impose un bilan soigneux avec examen otologique systématique. L'oreille externe ou moyenne peut être atteinte (surdité de transmission), parfois l'oreille interne (surdité de perception endocochléaire ou rétrocochléaire). On souligne l'importance des examens auditifs électro-physiologiques dans le cadre de ce bilan.

Mots-clés :

Surdité adulte, surdité enfant, dépistage, neurinome, presbyacousie, audiogramme, PEA

Références :

- Polycopié ORL, Pr Charachon, Pr Reyte.
- Oto-rhino-laryngologie. M. Portmann, D. Portmann. 4ème Edition Masson, 95-111, 1991
- Précis d'ORL. M. Portmann, Ed. Masson 1982
- Décision en ORL, F. Chabolle, E-N Garabédian, Ed. Vigot 1994 : p.31 à 72

Exercices :

1. Interrogatoire

Hypoacousie ou *surdité* : unilatérale / bilatérale

- brusque : circonstances / progressive : date d'apparition, durée, évolution
- isolée / associée :
 - vertiges
 - acouphènes
 - otalgie
 - otorrhée
 - fièvre, signes généraux...
 - paralysie faciale
 - signes neurologiques
 - +- retard psychomoteur associé
- contexte familial (parents, fratrie, grands-parents, cousins) de surdité ou de malformation(s)
- anamnèse : grossesse, accouchement, période néonatale, antécédents infectieux
- antécédents : vasculaire, métabolique, traitement ototoxique, chirurgie de l'oreille, exposition professionnelle.

Il est important d'apprécier le retentissement sur la vie professionnelle et sociale.

2. Examen clinique

Examen primordial : l'otoscopie.

A l'aide d'un otoscope, d'un microscope si besoin.

On examine le conduit, le tympan, les reliefs ossiculaires, la mobilité de la membrane tympanique mais également le rhino, l'oro et l'hypopharynx.

Examen des paires crâniennes.

Examen ORL complet.

3. Acoumétrie

Epreuve de Weber : Diapason centré (front, menton)

- Surdit  de perception : vibration perçue du cot  sain
- Surdit  de transmission : du cot  atteint

Test de Rinne : En deux temps, d'abord vibration osseuse (masto de) puis a rienne, en regard du CAE

- Positif : vibration osseuse < a rienne
Oreille normale ou surdit  de perception
- N gatif : vibration osseuse > a rienne
Surdit  de transmission

4. Audiom trie

Audiom trie tonale liminaire :

- mesure des seuils auditifs par fr quence : 125 - 8000 Hz
- conduction osseuse : CO (vibrateur)
- conduction a rienne : CA ( couteur)




Diagramme : audiométrie liminaire tonale

Audition normale : CO = CA
(D.Q. Nguyen)




Diagramme : audiométrie liminaire tonale

Surdité de transmission : CO (normale) > CA (abaissée)
(D.Q. Nguyen)




Diagramme : audiométrie liminaire tonale
Surdité de perception : CO (abaissée) = CA (abaissée)
(D.Q. Nguyen)




Diagramme : audiométrie liminaire tonale
Surdité mixte : CO (abaissée) > CA (abaissée)
(D.Q. Nguyen)

On définit :

Perte auditive (dB)	Hypoacousie
0-20 dB	Audition normale
20-40 dB	légère
40-70 dB	moyenne
70-90 dB	sévère
>90dB	Sub-cophose

Audiométrie vocale :

Elle précise le seuil d'intelligibilité à partir de listes de mots émises.

- liste de mots à répéter (liste de Laffon, Fournier)
- mesure de la compréhension auditive (% de distorsion)

Une discordance avec l'audiométrie tonale fait évoquer une cause rétro-cochléaire.

Tympanométrie :

Mesure la compliance du système tympano-ossiculaire.

Elle permet la recherche du réflexe stapédien.

Réflexe stapédien :

Recrutement = lésion endo-cochléaire

5. Autres examens complémentaires

5.1. Potentiels évoqués auditifs (PEA)

Etudie les fréquences 2000 à 4000 Hz

Retenir : allongement de l'intervalle I-V = atteinte rétro-cochléaire

Les résultats des méthodes objectives doivent être concordants avec ceux des méthodes subjectives.




Diagramme : potentiels évoqués auditifs PEA :
ondes I à V, Intervalle I-V < 0.24
(D.Q. Nguyen)

5.2. Oto-émissions acoustiques provoquées OEAP

Dépistage surdité nouveau-né+++

Elles reposent sur l'émissions de sons par la cochlée en réponse à une stimulation sonore (c'est donc un test auditif objectif).

Retenir : la présence d'OEAP témoigne d'une audition dont le seuil n'est pas supérieur à 30 dB. En cas d'absence d'OEA, il faut confirmer une éventuelle surdité avec des PEA.

Les résultats des méthodes objectives doivent être concordants avec ceux des méthodes subjectives.

6. Imagerie

Ce bilan ne doit être demandé qu'après bilan clinique et audiométrique complet.

Scanner des rochers : coupes coronales et axiales natives, millimétriques, symétriques sans injection.

Analyse des osselets, oreille moyenne, cavités postérieures

IRM +/- gadolinium des angles ponto-cérébelleux : recherche d'une lésion rétro-cochléaire (neurinome, méningiome...)

7. Synthèse

7.1. Surdité de transmission

Otoscopie anormale ou normale (otospongiose, atteinte ossiculaire isolée)

- Weber vers l'oreille atteinte
- Rinne négatif
- Tympanométrie normale ou altérée
- Signes associés : douleur, otorrhées....
- PEA inutiles
- Imagerie de 1° intention : scanner des rochers
- **Etiologies :**
 - otites moyennes aiguës ou chroniques
 - otospongiose ou fixation des osselets
 - traumatisme du tympan, des osselets
 - malformation d'oreille ...

7.2. Surdité de perception

Otoscopie normale, tympanométrie normale

- Weber vers l'oreille saine
- Rinne positif
- Vocale perturbée (distorsion)
- PEA fondamentaux (rétro-cochléaire ?)
- Signes associés : vertiges, paralysie faciale, signes neurologiques
- Imagerie de 1° intention : IRM avec gadolinium
- **Etiologies :**

- **endocochléaire** :
audiométrie vocale et PEA normaux, atteinte bilatérale ou unilatérale?
Presbycusie, Ménière, trauma sonore, atteinte virale, toxique.....
- **rétro cochléaire** : PEA anormaux, unilatéral+++
Neurinome de l'acoustique, méningiome...

8. Orientation diagnostique

8.1. Surdit  de transmission

Les  tiologies sont domin es par l'otite s reuse et l'otite chronique.

8.1.1. Atteinte de l'oreille externe

- Bouchon de c rumen, CE
- Malformations cong nitales (aplasie, syndrome malformatif...)
- Otite externe, mycose, furoncle (QS Otorrh e, Otalgie)
- Cholest atome du conduit
- Tumeurs b nignes (ost ome, polype), malignes (c.  pidermo ide, rhabdomyosarcome...)

8.1.2. Atteinte de l'oreille moyenne

A tympan normal :

- Otospongiose : +++ classiquement, surdit  de transmission   tympan normal avec
- Abolition r flexe stap dien. Traitement chirurgical +++
- Syndrome de Lobstein : ankylose stap do-vestibulaire bilat avec fragilit  osseuse, teinte bleu des scl rotiques
- Malformation ossiculaire, luxation ossiculaire (traumatisme QS Imp dancem trie)

A tympan pathologique :

- QS Otite moyenne aigu  (perforation tympanique ?)
- QS Otite moyenne chronique, Cholest atome, Otite s reuse+++ (enfant, foyer ad no dien, imp dancem trie et otoscopie tr s  vocateurs)
- Tympanoscl rose
- H motympan, traumatisme rocher QS Otalgie, Otorrh e
- Tumeurs :
 - paragangliomes tympano-jugulaire (bombement violac e et pulsatile du tympan)
 - cancer de l'oreille moyenne, ad nome, neurinome du facial, m ningiome (plus rares)

8.2. Surdit  de perception

Le traitement chirurgical est rarement de mise (appareillage auditif) mais le bilan est dominé par le dépistage précoce du neurinome de l'acoustique.

8.2.1. Surdit  endocochl aire

Surdit  brusque :

- Classiquement, urgence th rapeutique (int r t des cortico ides)
- Baisse brutale sur 3 fr quences (>30dB)
- Recrutement (atteinte endocochl aire)
- Attention,   distance, il est classique de faire r aliser des PEA pour  liminer un neurinome (attente r trocochl aire).

Surdit  fluctuante :

QS surdit  brusque. Si vertige, recherche une *maladie de M ni re*, une fistule labyrinthique.

Traumatisme acoustique (interrogatoire, milieu professionnel, bilat ral le plus souvent, encoche sur les fr quences aigu s), traumatisme cr nien (fracture du rocher, QS otoliquorrh e).

Surdit  d'origine infectieuse (atteinte souvent mixte, cochl aire et vestibulaire, attention chez l'enfant).

Surdit  d'origine toxique (aminoside++, aspirine   fortes doses, quinine, diur tiques, cisplatine...).

Presbyacousie +++ :

Age > 50 ans (mais attention aux formes pr coces), acouph nes.

Audiogramme : courbe en pente de ski , bilat rale, en r gle sym trique

Certificat d'appareillage auditif externe (QS annexe, appareillage conventionnel)

Si sujets jeunes et/ou intol rance port appareillage auditif externe, discuter un implant d'oreille moyenne.

8.2.2. Surdit  r tro-cochl aire

On note un allongement de l'intervalle 1-5 aux PEA.

Neurinome de l'acoustique++ :

Examen vestibulaire et neurologique (paires cr niennes)

Allongement intervalle I-V PEA

IRM+/- gadolinium

Le traitement se discute au cas par cas, selon le stade de la tumeur, l' volution clinique et le terrain : surveillance (sujets  g s, contre-indication chirurgicale), chirurgie (voie translabyrinthique, r trolabyrinthique, r tro-sigmo ide, sus-p treuse), radioth rapie (gamma-knife, pour des cas tr s pr cis).

Autres tumeurs de l'angle ponto-c r belleux (APC) : m ningiome, gliome, cholest atome intra-p treux, m tastase,...)

S quelles de m ningite infectieuse

8.2.3. Atteinte centrale des voies auditives

En amont du nerf auditif

Intérêt des PEA (valeur localisatrice)

Tumeur, lésion vasculaire, SEP...

8.3. Annexe : surdité du nouveau-né et de l'enfant

Le dépistage doit être le plus précoce possible (retentissement sur le langage).

Néonatale: Toute circonstance pathologique sévère peut entraîner une surdité et doit déclencher une démarche de **dépistage** ciblé de la surdité de l'enfant :

- Pathologie de grossesse
- Accident obstétrical
- Détresse respiratoire
- Hyperbilirubinémie
- Syndrome malformatif
- Méningites bactériennes, autres infections néonatales...

Cependant, la démarche actuelle est d'instaurer un dépistage systématique dans les maternités (oto-émissions) et de nombreux programmes sont à l'étude, soulevant les problèmes de faisabilité et économique.

Chez l'enfant :

L'étiologie infectieuse domine. Intérêt du dépistage+++ mais également d'un suivi rigoureux (9^{ème}, 24^{ème} mois).