

Xanax

Indications, Posologie, Contre indications, Effets indésirables

Source RESIP-BCB

XANAX 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30

Classe thérapeutique :	<u>Neurologie-psychiatrie</u>
Principes actifs :	<u>Alprazolam</u>
Statut :	Médicament soumis à prescription médicale
Prix de vente TTC :	2,19 €
Taux de remboursement SS :	65 %
Laboratoire :	<u>Pfizer Holding France</u>

Indications

- Traitement symptomatique des manifestations anxieuses sévères et/ou invalidantes.
- Prévention et traitement du delirium tremens et des autres manifestations du sevrage alcoolique.

Posologie

L'utilisation de l'alprazolam n'est pas recommandée chez l'enfant, en l'absence d'étude. De plus, le comprimé n'est pas une forme adaptée à l'enfant de moins de 6 ans (risque de fausse route).

Voie orale.

Le dosage 0,25 mg est plus particulièrement adapté au sujet âgé, à l'insuffisant rénal ou hépatique.

- **Dose** :

Dans tous les cas, le traitement sera initié à la dose efficace la plus faible et la dose maximale de 4 mg/jour ne sera pas dépassée.

. En général, chez l'adulte, le traitement sera débuté à la posologie de 0,75 mg à 1 mg par jour, réparti en 3 prises de la manière suivante :

0,25 mg le matin et à midi, et 0,25 à 0,50 mg le soir.

La posologie sera ensuite adaptée individuellement en fonction de la réponse thérapeutique.

La posologie moyenne se situe entre 1 et 2 mg par jour.

. Chez l'enfant, le sujet âgé, l'insuffisant rénal ou hépatique : il est recommandé de diminuer la posologie, de moitié par exemple.

- **Durée** :

. Le traitement doit être aussi bref que possible. L'indication sera réévaluée régulièrement surtout en l'absence de symptômes. La durée globale du traitement ne devrait pas excéder 8 à 12 semaines pour la majorité des patients, y compris la période de réduction de la posologie (voir rubrique mises en garde et précautions d'emploi).

Dans certains cas, il pourra être nécessaire de prolonger le traitement au-delà des périodes préconisées. Ceci suppose des évaluations précises et répétées de l'état du patient.

. Prévention et traitement du delirium tremens et des autres manifestations du sevrage alcoolique : traitement bref de l'ordre de 8 à 10 jours.

Contre indications

CONTRE-INDIQUE :

- Ce médicament ne doit jamais être utilisé dans les situations suivantes :
 - . hypersensibilité au principe actif ou à l'un des autres constituants,
 - . insuffisance respiratoire sévère,
 - . syndrome d'apnée du sommeil,
 - . insuffisance hépatique sévère, aiguë ou chronique (risque de survenue d'une encéphalopathie),
 - . myasthénie.
- Le comprimé n'est pas une forme adaptée à l'enfant de moins de 6 ans (risque de fausse route).
- *En raison de la présence de lactose*, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.

DECONSEILLE :

- Allaitement : l'utilisation de ce médicament pendant l'allaitement est déconseillée.
- Eviter la prise de boissons alcoolisées et de médicaments contenant de l'alcool.

Effets indésirables

Ils sont en rapport avec la dose ingérée, la sensibilité individuelle du patient.

- Effets indésirables neuropsychiatriques (voir rubrique mises en garde et précautions d'emploi) :

- . amnésie antérograde, qui peut survenir aux doses thérapeutiques, le risque augmentant proportionnellement à la dose,
- . troubles du comportement, modifications de la conscience, irritabilité, agressivité, agitation,
- . dépendance physique et psychique, même à doses thérapeutiques avec syndrome de sevrage ou de rebond à l'arrêt du traitement,
- . sensations ébrieuses, céphalées, ataxie,
- . confusion, baisse de vigilance voire somnolence (particulièrement chez le sujet âgé), insomnie, cauchemars, tension,
- . modifications de la libido.

- Effets indésirables cutanés :

éruptions cutanées, prurigineuses ou non.

- Effets indésirables généraux :

hypotonie musculaire, asthénie.

- Effets indésirables oculaires :

diplopie.

- Effets indésirables hépatiques :

très rares cas d'augmentation des enzymes hépatiques, ictère, hépatites cytolytiques ou cholestatiques.

Voir aussi les génériques du Xanax...

[ALPRAZOLAM ALTER 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM ARROW 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM ARROW 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 60](#)

[ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 1 Flacon de 30](#)

[ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM CRISTERS 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM EG 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM G GAM 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM GNR 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM IREX 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 1 Flacon de 30](#)

[ALPRAZOLAM ISOMED 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM MYLAN 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM RATIOPHARM 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM RPG 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM SANDOZ 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM TEVA 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[ALPRAZOLAM WINTHROP 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 1 Flacon de 30](#)

[ALPRAZOLAM ZYDUS 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 1 Flacon de 30](#)

[ALPRAZOLAM ZYDUS 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 1 Plaquette thermoformée de 30](#)

Voir aussi les autres formes de Xanax...

[XANAX 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 100](#)

[XANAX 0,25 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[XANAX 0,5 mg Comprimé sécable Boîte de 100](#)

[XANAX 0,5 mg Comprimé sécable Boîte de 30](#)

[XANAX 1 mg Comprimé sécable Boîte de 100](#)