

# ANAFRANIL

Antidépresseur imipraminique

## Dans quel cas le médicament ANAFRANIL est-il prescrit ?

Ce médicament appartient à la famille des antidépresseurs imipraminiques. Il possède également des effets atropiniques et des propriétés antalgiques indépendantes de son effet antidépresseur.

Il est utilisé dans le traitement :

- des états dépressifs,
- des attaques de panique (traitement préventif),
- des troubles obsessionnels compulsifs,
- des douleurs neuropathiques de l'adulte,
- de l'énurésie nocturne de l'enfant, en l'absence de lésions des voies urinaires (comprimé à 10 mg).

## Présentations du médicament ANAFRANIL

**ANAFRANIL 10 mg** : comprimé (jaune pâle) ; boîte de 60  
Sur ordonnance (Liste I) - Remboursable à 65 % - **Prix : 1,94 €.**

**ANAFRANIL 25 mg** : comprimé (jaune pâle) ; boîte de 50  
Sur ordonnance (Liste I) - Remboursable à 65 % - **Prix : 3,18 €.**

**ANAFRANIL 75 mg** : comprimé sécable (rose) ; boîte de 20  
Sur ordonnance (Liste I) - Remboursable à 65 % - **Prix : 3,86 €.**

Les prix mentionnés ne tiennent pas compte des « honoraires de dispensation » du pharmacien.

## Composition du médicament ANAFRANIL

	p cp	p cp	p cp
Clomipramine chlorhydrate	10 mg	25 mg	75 mg
Lactose	+	+	+

Substance active : Clomipramine chlorhydrate

Excipients communs : Talc, Titane dioxyde

Autres excipients (spécifiques à certaines formes) : Acide stéarique, Amidon de maïs, Calcium stéarate, Cellulose, Cellulose microcristalline, Eudragit, Fer jaune oxyde, Fer rouge oxyde, Glycérol, Hypromellose, Lactose, Lactose monohydrate, Macrogol 8000, Magnésium stéarate, Phosphate dicalcique, Povidone acétate, Povidone K 30, Ricin huile hydrogénée polyoxyéthylénée, Saccharose, Silice colloïdale, Silice colloïdale anhydre, Sucre cristallisé

## Contre-indications du médicament ANAFRANIL

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- risque de glaucome à angle fermé,
- risque de rétention des urines (adénome de la prostate),
- infarctus du myocarde récent (moins de 3 mois),
- en association avec les IMAO non sélectifs ou avec les médicaments contenant du sultopride.

## Attention

Ce médicament présente des effets atropiniques. Il peut provoquer un glaucome aigu chez les personnes prédisposées : œil rouge, dur et douloureux, avec vision floue. Une consultation d'extrême urgence auprès d'un ophtalmologiste est nécessaire.

Des précautions sont requises en cas d'épilepsie, de maladie cardiaque, d'insuffisance hépatique, d'insuffisance rénale et chez la personne âgée, notamment en cas de constipation chronique, de tendance aux vertiges ou aux baisses de tension.

Tous les traitements antidépresseurs sont susceptibles d'induire un épisode maniaque chez les personnes prédisposées : en cas d'euphorie, d'excitation inhabituelle ou de comportement anormal survenant sous traitement, une consultation médicale rapide est nécessaire.

Avant une anesthésie locale, notamment chez le dentiste, signalez la prise de ce médicament.

Évitez les boissons alcoolisées : augmentation du risque de somnolence.

image: <http://eurekasante.vidal.fr/files/content/images/vidal/conducteur.gif>

Si vous devez conduire ou utiliser une machine dangereuse, assurez-vous préalablement que ce médicament n'altère pas votre vigilance.

## Interactions du médicament ANAFRANIL avec d'autres substances

Ce médicament ne doit pas être associé aux médicaments suivants :

- IMAO non sélectifs (**MARSILID**) : des délais précis doivent être respectés entre l'arrêt de l'IMAO et le début du traitement par ce médicament, et inversement.
- sultopride (disponible uniquement à l'hôpital) : risque de troubles du rythme cardiaque graves.

Il peut également interagir avec les IMAO sélectifs A et avec les médicaments contenant l'une des substances suivantes : adrénaline, noradrénaline, clonidine, guanfacine.

Informez par ailleurs votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un antidépresseur inhibiteur de la recapture de la sérotonine, un médicament anticonvulsivant, antihypertenseur, atropinique, sédatif, ou contenant de la carbamazépine, du bupropion, de la thioridazine ou du baclofène.

## Fertilité, grossesse et allaitement

### Grossesse :

Si une grossesse survient pendant le traitement, consultez votre médecin. Il appréciera le risque éventuel lié à l'utilisation de ce médicament dans votre cas.

Si le traitement est poursuivi jusqu'à l'accouchement, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire.

## **Allaitement :**

Ce médicament est susceptible de passer faiblement dans le lait maternel : l'allaitement est déconseillé sans avis médical.

## **Mode d'emploi et posologie du médicament ANAFRANIL**

La dose quotidienne est généralement absorbée en une prise, le plus souvent le soir, au cours ou en dehors du repas.

Les comprimés doivent être avalés, sans être croqués, avec un verre d'eau.

## **Posologie usuelle :**

État dépressif, troubles obsessionnels compulsifs : 75 mg à 150 mg par jour.

Prévention des attaques de panique : 20 mg à 150 mg par jour.

Douleurs neuropathiques de l'adulte : 10 mg à 150 mg par jour, en fonction des traitements antalgiques associés. La posologie est atteinte progressivement.

Énurésie :

- Enfant de plus de 6 ans : 1 à 3 comprimés à 10 mg, selon l'âge, le soir au coucher.

## **Conseils**

L'efficacité des antidépresseurs n'est généralement pas immédiate. Un délai pouvant atteindre plusieurs semaines est parfois nécessaire pour que les effets bénéfiques se fassent sentir. Les effets indésirables éventuels apparaissant en début de traitement ne doivent pas vous conduire à l'arrêter prématurément.

Chez la personne souffrant de dépression, un état anxieux peut apparaître ou s'aggraver en début de traitement ; un anxiolytique est parfois prescrit de manière temporaire par le médecin pour prévenir ou traiter ces manifestations.

Lorsque les symptômes de la dépression ont disparu, le traitement doit absolument être poursuivi pendant la durée prescrite afin de consolider la guérison. Un arrêt prématuré exposerait à une rechute. La durée d'un traitement antidépresseur est rarement inférieure à 6 mois.

Les antidépresseurs ne créent pas de dépendance. Néanmoins, il est préférable d'arrêter le traitement progressivement en diminuant la posologie ou en espaçant les prises pour éviter les effets indésirables transitoires observés en cas d'interruption brutale.

L'utilisation de ce médicament dans les cas d'énurésie ne se conçoit que dans le cadre d'un traitement plus global : rééducation, prise en charge psychologique éventuelle.

Une prise de poids peut être observée au cours du traitement. Une alimentation équilibrée, et si nécessaire les conseils d'un nutritionniste, peuvent prévenir et limiter ce phénomène.

## **Effets indésirables possibles du médicament ANAFRANIL**

Comme tous les antidépresseurs imipraminiques :

- sécheresse de la bouche, constipation, troubles de l'accommodation, tachycardie, sueurs, difficulté à uriner, troubles sexuels, hypotension orthostatique, somnolence ;

- plus rarement : tremblements, convulsions chez les personnes prédisposées, confusion des idées, prise de poids, tension anormale des seins, écoulement de lait par le mamelon, bouffées de chaleur, réaction allergique, hépatite, anomalie de la numération formule sanguine, troubles cardiaques, excitation anormale.