

ANTIVERTIGINEUX ACETYLLEUCINE TEVA 500 mg (générique du Tanganil)

ACETYLLEUCINE TEVA 500 mg Comprimé Boîte de 30

Mis à jour le 12 février 2014

ACETYLLEUCINE TEVA : ses indications

Traitement symptomatique de la crise vertigineuse.

ACETYLLEUCINE TEVA : pathologies pour lesquelles il peut-être prescrit

- Crise vertigineuse

Classe thérapeutique	Neurologie-psychiatrie
Principes actifs	Acétylleucine
Excipients	Amidon de maïs, Calcium carbonate, Magnésium stéarate (E572)
Statut	Ce médicament est NON SOUMIS A PRESCRIPTION MEDICALE
Prix de vente TTC	4,25 €
Tx de remboursement SS	30 %
Laboratoire	Teva Sante

Présentation Précautions Grossesse et allaitement Effets indésirables

ACETYLLEUCINE TEVA : sa posologie

Chez l'adulte

1,5 à 2 g par jour, soit 3 à 4 comprimés par jour, en deux prises matin et soir.

La durée du traitement est variable selon l'évolution clinique (entre 10 jours et 5 à 6 semaines); au début du traitement ou en cas d'insuccès, la posologie peut être augmentée sans inconvénient jusqu'à 3 g et même 4 g par jour.

Mode d'administration :

Voie orale.

ACETYLLEUCINE TEVA : son aspect et forme

Comprimé blanc, biconvexe et de forme allongée.

Licence : © <http://www.doctissimo.fr/medicament-ACETYLLEUCINE-TEVA.htm>