

# Éjaculation rétrograde

## symptôme, cause et traitement

L'éjaculation rétrograde se rapporte à l'entrée du sperme dans le réservoir souple au lieu de sortir par l'urètre pendant l'éjaculation.

Dans l'éjaculation rétrograde, la pièce du réservoir souple qui se ferme normalement pendant les restes d'éjaculation (le cou de réservoir souple) ouverts, faisant voyager le fluide éjaculatoire vers l'arrière dans le réservoir souple.

### Symptômes d'éjaculation rétrograde

Normalement, un mâle en bonne santé d'adulte éjacule une demi- à une cuillerée à café de sperme pendant l'orgasme, mais la quantité change considérablement. Chez les hommes avec l'éjaculation rétrograde, la quantité de sperme est diminuée nettement ou il y a une apogée sèche (orgasme sans sperme).

Un diagnostic peut être fait si le sperme sont trouvés dans l'urine après des rapports. Si l'urine après les rapports ou la masturbation semble nuageuse, c'est habituellement une indication d'éjaculation rétrograde, puisque le sperme dans le réservoir souple sera vidé avec l'urine.

### Causes d'éjaculation rétrograde

L'éjaculation rétrograde peut être provoquée par la prostate antérieure ou la chirurgie urétrale, le diabète, quelques médicaments, y compris quelques drogues employées pour traiter l'hypertension et une certaine humeur changeant des drogues.

La condition est relativement rare et peut se produire partiellement ou complètement. La présence du sperme dans le réservoir souple est inoffensive. Elle se mélange dans l'urine et laisse le corps avec l'urination normal. Les hommes avec du diabète et ceux qui ont eu la chirurgie génito-urinaire de région sont au plus grand risque de développer la condition.

### Traitement d'éjaculation rétrograde

Si l'éjaculation rétrograde est provoquée par des drogues, le déplacement de la drogue spécifique peut résoudre la condition. L'éjaculation rétrograde causée par le diabète ou après chirurgie génito-urinaire de région peut être sensible à l'utilisation de epinephrine-comme des drogues (telles que le pseudoephedrine ou l'imipramine).

Des médicaments froids communs peuvent parfois être employés pour corriger le problème. En outre, votre médecin peut vous mettre sur le médicament pour diminuer la qualité acide de votre urine, empêchant l'urine de tuer le sperme peut être prescrit. Après éjaculation, le sperme est enlevé de l'urine et peut alors être employé avec IUI ou un procédé d'IVF.

Si l'éjaculation rétrograde est due aux dommages graves de nerf ou de muscle, il peut ne pas être possible de reconstituer l'éjaculation normale. Pour les hommes qui veulent engendrer un enfant, il peut être possible de rechercher le sperme de l'orgasme suivant d'urine pour l'usage dans l'insémination artificielle.

### Prévention d'éjaculation rétrograde

La bonne commande de maintien de sucre de sang chez les hommes diabétiques peut être utile en empêchant le développement de cette condition. Éviter les drogues qui causent l'éjaculation rétrograde empêchera la condition se développant en raison de leur utilisation.